



BLEUET

- Gezonde aardappel
- Gladde paarse schil met paars vlees
- Goede consumptie kwaliteit
- Goede bewaarbaarheid
- Geschikt voor teelt in Europa



GEBRUIK: THUIS + RESTAURANT

RASEIGENSCHAPPEN

Rijptijd	8	vroeg
Opkomst	8	vlot
Loofontwikkeling	8	goed
Bessen	3	zeer weinig
Schilkleur	9	paars
Vleeskleur	3	paars
Knolvorm	RO	rond ovaal
Oogdiepte	7	vlak
Regelmaat knolvorm	7	uniform
Grootte knol	6	redelijk
Sortering	7	uniform
Knolaantal	14-18	per plant

RASKWALITEITEN

Kiemrust	5	vrij kort
Onderwatergewicht	350	
Droge stof %	19,21	
Zetmeel %	13,35	
Kooktype	A	vast
Verkleuring	8	geen
Frites	6	gemiddeld
Chips	6	gemiddeld

RESISTENTIES / TOLERANTIES

Aardappelmoeheid	Ro1,4,5	AM
Wratziekte	1	immuun
Onderzeeërvorming	7	ongevoelig
Sencorgevoeligheid	7	weinig gevoelig
Phytophthora loof	4	vatbaar
Phytophthora knol	7	weinig vatbaar
Alternaria	6	weinig vatbaar
Erwinia	8	weinig gevoelig
Doorwas	8	weinig gevoelig
Droogtetolerantie	8	weinig gevoelig
Hittetolerantie	7	weinig gevoelig
Y-virus	7,5	weinig vatbaar
Yntn-virus	8	weinig gevoelig
Kringerigheid	7	resistent
Rooibeschatiging	5	gevoelig
Blauwgevoeligheid	4	gevoelig
Fusarium	4	zeer vatbaar
Zilverschurft	5,5	vatbaar
Schurft	6	weinig vatbaar
Poederschurft	6	weinig vatbaar



VOORBEHANDELING POOTGOED EN POTEN

- Bleuet heeft een gemiddelde kiemrust, het gebruik van voorgekiemd pootgoed is daarom zeer effectief.
- Poot de aardappelen 1 à 2 cm onder het maaiveld, poten in een grond met een goede structuur.
- Grond of knolbehandeling tegen Rhizoctonia, zilverschurft en zwarte spikkel wordt aanbevolen.

POOTAFSTANDEN (Op zwaardere gronden de kleinste pootafstand aanhouden)

Pootgoed maat	28/35	33/50	50/60
Plantafstand	15-20 cm	20-25 cm	25-30 cm

BEMESTING (INCLUSIEF BODEMVOORRAAD)

N	± 130 - 180 kg	Inclusief N-min (2/3 voor poten, eventueel 1/3 als overbemesting)
P	Normaal	Volgens bodemanalyse
K	Normaal	Volgens bodemanalyse
Mg, Mn, Ca, Bo		Als bladmeststof geven; deze micro-elementen werken stimulerend op de groei en hebben een positief effect op de kwaliteit.

TEELT

- Bleuet kan goed geteeld worden in Europa.
- Het ras heeft een snelle opkomst met een goede loofontwikkeling.
- Verdraagt herbiciden Sencor (Metribuzin) en Boxer (Prosulfocarb), wees voorzichtig met de dosering.
- Normale Phytophthora-besputtingen uitvoeren, het Bleuet is vatbaar in het loof en knol weinig vatbaar.

LOOFDODING, OOGST EN BEWARING

- Na loofvernietiging de aardappelen voldoende laten afharden, kijk ook naar de rijpheid van het gewas.
- Zorg voor een snelle droging om zilverschurft te voorkomen (gebruik desnoods kachels). Zorg dat het wondhelingsproces goed verloopt.
- Als de partij droog is de temperatuur langzaam terugbrengen naar 6°C. Voorkom condensvorming in de bovenlaag van de hoop!
- Het ras kan langdurig bewaard worden bij een temperatuur van 5°C.